

PERSONAL SANITARIO – RECOMENDACIONES COVID-19

El personal de salud y todas las personas que están implicadas en una institución de salud deben mantener la mayor discreción y evitar comentarios relacionados con una persona con probabilidad o confirmación prueba, respetarle su derecho a la intimidad, para evitar discriminación/estigma y poner en peligro su integridad.

Ante la violación de la intimidad del paciente, el gobierno nacional de Colombia ha determinado sancionar y multar a personas que divulguen los resultados de los pacientes.

La responsabilidad individual es tan importante como la que exigimos a los que nos dirigen y gobiernan, tener en cuenta que como personal del área de la salud somos un ejemplo para los que nos rodean y para los pacientes.

Retirar ropa de abrigo u otras prendas que no correspondan al uniforme.

Extremar medidas de higiene individual (especialmente aquellos profesionales que estén en contacto directo con los pacientes, fluidos corporales y/o material biológico para muestras): no usar collares, pulseras, relojes, correas para tarjetas identificativas, usar el cabello recogido, etc.

Personal asintomático hará uso de mascarilla quirúrgica intentando en todo momento mantener distanciamiento físico interpersonal y con los pacientes, de al menos un (1) metro.

Preparación para un examen clínico

Si usted es clínico:

- Implemente medidas de prevención y control de infecciones mientras espera los resultados de las pruebas, incluido el aislamiento y la cohorte de pacientes de acuerdo con su plan operativo de IRA.
- Use equipo de protección personal: mínimo debe contar con una máscara quirúrgica resistente a los fluidos, delantal y guantes desechables de un solo uso y protección para los ojos si se anticipa contaminación de sangre y fluidos corporales en los ojos o la cara.



GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ
SECRETARÍA DE SALUD



Comité Departamental para la Prevención, Contención y Mitigación del Virus

- Si un paciente que cumple con la definición de caso, el personal de salud debe usar una bata desechable repelente de fluidos de manga larga, guantes y protección para los ojos. Pídale al/la paciente que use una mascarilla quirúrgica mientras la transporta a la habitación individual o al área de AISLAMIENTO.
- Revise los protocolos y planes de contingencia institucionales.

#CHOCÓSINCORONAVIRUS

#GENERANDOCONFIANZA

Comité Departamental para la Prevención, Contención y Mitigación del Virus

Publicado: 26 de marzo de 2020